


18. Grafy kolika z funkcí $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8$, kde

$$f_1: y = x^2, \quad f_2: y = -x^2, \quad f_3: y = \sqrt{x}, \quad f_4: y = -\sqrt{x},$$

$$f_5: y = \sqrt{-x}, \quad f_6: y = -\sqrt{-x}, \quad f_7: y = \sqrt{|x|}, \quad f_8: y = -\sqrt{|x|}$$

můžeme vidět na obrázku?

- (A) žádné (B) 2 (C) 4
(D) 6 (E) všech 8




19. Najděte součet všech přirozených čísel x menších než 100, pro která je číslo $x^2 - 81$ dělitelné 100.

- (A) 200 (B) 100 (C) 90 (D) 81 (E) 50

20. Posloupnost reálných funkcí $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ vyhovuje pro každé reálné číslo x následujícím dvěma podmínkám: $f_1(x) = x$ a $f_{n+1}(x) = \frac{1}{1 - f_n(x)}$ pro přirozená čísla n . Najděte $f_{2011}(2011)$.

- (A) 2011 (B) $-\frac{1}{2010}$ (C) $\frac{2010}{2011}$ (D) 1 (E) -2011

21. Robin Hood vystřelil tři šípy do terče na obrázku; čísla udávají počet bodů za zásah vyznačené oblasti. Všemi šípy zasáhl cíl. Vyznačte počet všech různých hodnot součtů bodů, které mohl získat.



- (A) 13 (B) 17 (C) 19 (D) 20 (E) 21

22. Necht' a, b, c jsou přirozená čísla taková, že $a^2 = 2b^3 = 3c^5$. Zjistěte nejmenší možný počet dělitelů jejich součinu abc (včetně 1 a abc).

- (A) 30 (B) 49 (C) 60 (D) 77 (E) 1 596

23. Do políček tabulky 4×5 je zapsáno 20 navzájem různých přirozených čísel. Čísla na libovolných dvou sousedních políčkách (políčka se společnou stranou) mají společného dělitele většího než 1. Označme n největší číslo zapsané do tabulky. Najděte nejmenší možnou hodnotu n .

- (A) 21 (B) 24 (C) 25 (D) 26 (E) 40

24. Krychle $3 \times 3 \times 3$ je složena z 27 stejných malých krychlí. Rovina kolmá k tělesové úhlopříčce velké krychle prochází jejím středem. Kolik malých krychlí tato rovina protíná?

- (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21



Úlohy za 3 body

1. Závodu se zúčastnili Michael, Fernando a Sebastian. Ihned po startu vedl Michael, druhý byl Fernando a třetí Sebastian. Během závodu si pak Michael a Fernando vyměnili pořadí devětkrát, Fernando a Sebastian desekrát, Sebastian a Michael jedenáctkrát. V jakém pořadí dojeli do cíle?


- (A) Michael, Fernando, Sebastian (B) Sebastian, Michael, Fernando
(C) Sebastian, Fernando, Michael (D) Fernando, Michael, Sebastian
(E) Fernando, Sebastian, Michael

2. Pro reálná čísla x a y platí $2^x = 15$ a $15^y = 32$. Určete hodnotu součinu xy .

- (A) 5 (B) $\log_2 15 + \log_{15} 32$ (C) $\log_2 47$
(D) 7 (E) $\sqrt{47}$

3. Během plavby po rozbouřeném moři se Jana pokusila nakreslit plán své vesnice. Nakreslila čtyři ulice, jejich sedm křižovatek a domy svých přátel. Ve skutečnosti jsou však Rovná ulice, Hřebíková ulice a Pravítková ulice přímé. Čtvrtá ulice se jmenuje Křivá. Kdo v ní bydlí?



- (A) Hana (B) Petr
(C) Jiří (D) Amálka
(E) nelze určit bez lepšího plánu



4. Všechna čtyřmístná čísla se součtem číslic 4 jsou seřazena od největšího k nejmenšímu. Kolikáté je číslo 2011?


- (A) 6. (B) 7. (C) 8. (D) 9. (E) 10.

5. Obdélníkový list papíru byl obtočen kolem válce. Poté jsme váleček s papírem rozřízli rovinným řezem procházejícím body X a Y dle obrázku. Dolní část papíru byla narovnána. Který z útvarů na obrázcích jsme mohli získat?



6. Na obrázku je čtyřúhelník $PQRS$, v němž platí $|PS| = |SR|$, $|\sphericalangle PSR| = |\sphericalangle PQR| = 90^\circ$, $ST \perp PQ$ a $|ST| = 5$. Určete obsah čtyřúhelníku $PQRS$.

(A) 20 (B) 22,5 (C) 25 (D) 27,5 (E) 30



7. Andrea napsala na tabuli všechna lichá čísla od 1 do 2011. Bára poté smazala všechny násobky tří. Kolik čísel zůstalo na tabuli?

(A) 335 (B) 336 (C) 671 (D) 1005 (E) 1006

8. Max a Hugo házejí několika hracími kostkami aby rozhodli, který z nich má skočit do ledového jezera. Jestliže nepadne žádná šestka, bude to Max; jestliže padne právě jedna šestka, bude to Hugo; jestliže padnou šestky aspoň dvě, neskočí ten den do jezera nikdo. Kolika kostkami házejí, jestliže oba mají stejnou pravděpodobnost skočit do jezera?

(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 9 (E) 17

Úlohy za 4 body

9. Ze tří obdélníků byl sestaven bez překrývání a mezer pravouhelník. První z obdélníků měl rozměry 7×11 , druhý 4×8 . Třetí z obdélníků byl zvolen tak, aby výsledný pravouhelník měl největší možný obsah. Určete rozměry třetího obdélníku.

(A) 1×11 (B) 3×4 (C) 3×8 (D) 7×8 (E) 7×11

10. Michal chce vyplnit políčka tabulky 3×3 celými čísly tak, aby hodnota součtu všech čísel v každém čtverci 2×2 byla 10. Čtyři čísla už jsou zapsána. Které z následujících čísel může udávat hodnotu součtu zbývajících pěti čísel.

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | |
| 1 | | 3 |
| | 4 | |


(A) 9 (B) 10 (C) 12
(D) 13 (E) žádná z možností (A)–(D)

11. Na výlet šlo 48 dětí. Šest z nich šlo s právě jedním sourozencem, devět dětí šlo právě s dvěma sourozenci a čtyři děti šly právě se třemi sourozenci. Zbytek dětí na výletě sourozence neměl. Z kolika rodin byly děti, které šly na výlet?

(A) 12 (B) 19 (C) 25 (D) 31 (E) 36

12. Stěrač čelního skla auta je sestaven tak, že stěrka RW a raménko OR mají stejnou délku a svírají pevný úhel velikosti α . Stěrač se se otáčí kolem bodu O a stírá vyznačenou plochu. Určete velikost úhlu β , který svírá pravá strana stírané plochy s tečnou k jejímu hornímu okraji.

(A) $135^\circ - \alpha$ (B) $45^\circ + \alpha$ (C) $90^\circ + \frac{\alpha}{2}$ (D) $135^\circ - \frac{\alpha}{2}$ (E) $180^\circ - \frac{\alpha}{2}$



13. Bratři Alois a Bedřich pravdivě odpověděli na otázky týkající se jejich společného šachového klubu. Alois prohlásil: „Všichni členové našeho klubu s výjimkou pěti dívek jsou chlapi.“ Bedřich pravil: „Mezi libovolnými šesti členy našeho klubu jsou alespoň čtyři dívky.“ Kolik členů má šachový klub?

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 12 (E) 18

14. V osudí je několik míčků. Na každém míčku je napsáno jedno přirozené číslo; všechna čísla jsou navzájem různá. Čísla dělitelná 6 jsou napsána na 30 míčcích, čísla dělitelná 7 jsou na 20 míčcích a čísla dělitelná 42 jsou na 10 z nich. Určete nejmenší možný počet míčků, které mohou být v osudí.

(A) 30 (B) 40 (C) 53 (D) 54 (E) 60

15. Na tabuli byla nakreslena (v kartézské soustavě souřadnic s obvyklou polohou os x a y) parabola $y = ax^2 + bx + c$ a na ní vyznačen bod $A[1, -10]$. Po smazání části tabule (včetně os) zůstala pouze část na obrázku. Které z následujících tvrzení může být nepravdivé?

(A) $a > 0$ (B) $b < 0$ (C) $a + b + c < 0$
(D) $b^2 > 4ac$ (E) $c < 0$



16. Ve výrazu

$$\frac{K \times A \times N \times G \times A \times R \times O \times O}{G \times A \times M \times E}$$

značí různá písmena různé číslice, stejná písmena stejné číslice. Najděte nejmenší možnou kladnou celočíselnou hodnotu, kterou tento výraz může nabýt.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 7

Úlohy za 5 bodů

17. Všechny strany šestiúhelníku $PQRSTU$ se dotýkají téže kružnice. Délky stran PQ , QR , RS , ST a TU jsou po řadě 5, 6, 7, 8 a 9. Vypočtete délku strany UP .

(A) 8 (B) 7 (C) 6
(D) 1 (E) nelze z daných informací určit